

# Isoniazida



**Marca comercial:** Nydrazid

La isoniazida, conocida también como INH, pertenece a la clase de medicamentos llamados antimicobacterianos. Estos productos previenen o combaten las infecciones causadas por cierto tipo de bacterias, incluso la causante de tuberculosis.

## Formas de empleo

La isoniazida está autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis en personas con infección por el VIH/SIDA, sola o junto con otros antimicobacterianos.

## Presentación/Administración

Se fabrica en jarabe o tabletas de administración oral y en solución inyectable. El jarabe o las tabletas deben tomarse 1 hora antes o 2 horas después de una comida. Los antiácidos que contienen hidróxido de aluminio reducen la absorción de la isoniazida y, por lo tanto, esta última debe tomarse por lo menos 1 hora antes de los antiácidos.

La isoniazida se vende mezclada con otros medicamentos antituberculosos: con rifampicina, en una cápsula llamada Rifamate, o con rifampicina y pirazinamida, en una tableta llamada Rifater. La piridoxina, otro medicamento, suele administrarse junto con isoniazida para ayudar a prevenir algunos de los efectos secundarios de la isoniazida que afectan el sistema nervioso.

## Contraindicaciones

Los pacientes deben informar al médico sobre cualquier problema de salud que tengan antes de tomar este medicamento.

## Posibles efectos secundarios

Junto con sus efectos deseables, la isoniazida puede causar algunos efectos adversos, incluso hepatitis (coloración oscura de la orina y coloración amarillenta de los ojos o la piel); síntomas prodrómicos de hepatitis (inapetencia, náusea o vómito, cansancio o debilidad poco comunes); neuritis periférica (movimientos torpes o inestabilidad; adormecimiento, hormigueo, ardor o dolor de las manos y los pies); convulsiones,

alteraciones del estado mental o del estado de ánimo; erupción cutánea o úlceras; fiebre; hemorragia o hematomas poco comunes; y visión borrosa o pérdida de la vista, con dolor de los ojos o sin éste. Los pacientes deben informar al médico si tienen síntomas de cualquiera de esos efectos secundarios.

Otros efectos secundarios pueden ser leves y disminuir o desaparecer con el uso continuo de este medicamento. Entre los efectos secundarios menos graves de este medicamento cabe citar dolor de estómago, diarrea, náusea y vómito. Los pacientes deben informar al médico si esos efectos secundarios continúan o son molestos.

## Interacción con otros medicamentos

Es preciso avisar al médico sobre cualquier otro medicamento que tome el paciente, ya sea recetado, de venta libre o natural (a base de hierbas).

## Ensayos clínicos

Para información sobre ensayos clínicos que tiene que ver con Isoniazida, visite el sitio Web de ClinicalTrials.gov en: <http://www.clinicaltrials.gov>. En la casilla de búsqueda, escriba: Isoniazida AND HIV Infections.

## Fabricantes

Isoniazid  
Hoffmann - La Roche Inc  
340 Kingsland St  
Nutley, NJ 07110-1199  
(800) 526-6367

Nydrazid  
Sandoz Inc  
506 Carnegie Center Drive  
Suite 400  
Princeton, NJ 08540  
(609) 627-8500

# ***Isoniazida***



## **Para más información**

---

Comuníquese con su médico o un especialista en información sobre salud de AIDSinfo:

- al teléfono: 1-800-448-0440 De lunes a viernes, de mediodía hasta las 5 p.m., hora del este
- al Live Help: [http://aidsinfo.nih.gov/live\\_help](http://aidsinfo.nih.gov/live_help)  
De lunes a viernes, de mediodía hasta las 4 p.m., hora del este